

»CAMI« MEDYCYNĄ REGENERACYJNĄ

ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA


i LASEROTERAPIA

31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4U
tel. 012 420 60 70, fax 012 420 60 71

www.cami-antiaging.eu
biuro.cami@gmail.com

POWIEKI DOLNE

Siły grawitacyjne uwidoczniają na powiekach dolnych wszystkie zmiany jakie zachodzą w związku z wiekiem i chorobami. Choroby tarczycy, nerek czy wątroby można podejrzewać patrząc komuś w oczy. W miarę upływu czasu nawet bez współistniejących chorób następuje zwiotczenie skóry powiek dolnych czy uwypuklenia tłuszczu okołogałkowego. Operacje korekcyjne mogą być wykonywane z dostępu zewnętrznego, tj. przez skórę (tuż poniżej brzegu rzęskowego) lub przezspojówkowo, tj. w obrębie worka spojówkowego.



Przedstawione powyżej fotografie ukazują obraz zwiotczenia powiek dolnych przed- i po zabiegu usunięcia nadmiaru skóry i niewielkiej przepukliny tłuszczowej. Blizny po zabiegu tuż poniżej brzegu rzęskowego są estetyczne, tj. prawie niewidoczne.



Przykład dokumentacji fotograficznej pacjentki z przepuklinami tłuszczowymi powiek dolnych operowanej z dostępu przez worek spojówkowy. Wypreparowano nadmiar tkanki tłuszczowej i przemieszczono go ponad dolnym brzegiem oczodołu uzyskując efekt estetycznego wygładzenia, a tym samym odmłodzenia wyglądu twarzy.

