



»CAMI« MEDYCYNA REGENERACYJNA

ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA

i LASEROTERAPIA

31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4U
tel. 012 420 60 70, fax 012 420 60 71

www.cami-antiaging.eu
biuro.cami@gmail.com

TERMINY KONTROLI:

- W przypadku operowania powiek pierwszym opatrunkiem są zwykle kompresy gazowe nasączone zimnym roztworem 3% kwasu bomego. Kwaśne środowisko zmniejsza obrzęki i dolegliwości bólowe oraz sprzyja szybszemu gojeniu się ran.
- Pierwsza kontrola jest zwykle przeprowadzana po 4-5 dniach. W tym czasie należy sprawdzić czy gojenie rany jest prawidłowe. W przypadku założenia opatrunku gazowego na powiekę sprawdzamy czy opatrunek założony w czasie zabiegu nie jest przemoczony wydzieliną, która mogłaby spowodować odparzenie brzegów rany i tym samym gorszy wygląd estetyczny blizny. Jeżeli brzegi rany są sklezione, a na szwach nie ma napięcia to po 5 dniach od zabiegu usuwamy szwy.
- Drugi opatrunek następuje zwykle po tygodniu od zabiegu. W tym czasie brzegi rany są już na tyle sklezione, że w okolicach, w których nie ma napięcia, jak np. na powiekach, można usunąć resztę szwów. Profilaktycznie po usunięciu szwów zakładamy paski z plastra, tzw. „steri-stripy”.
- Kolejne opatrunki są wykonywane w zależności od zapotrzebowania na kształtowanie jakości blizny pooperacyjnej. Jeżeli dojrzewanie jest opóźnione to włączamy maści przeciw narastaniu blizn oraz/lub laseroterapię.
- Uzyskanie bladej, miękkiej i elastycznej blizny jest wskazaniem do zaprzestania kontroli okolicy operowanej.

