

Chirurgia Plastyczna

PLASTYKA POWIEK



Pacjent powinien zrobić szczególne badania przed zabiegiem, a także pozostać pod ciągłą kontrolą lekarza prowadzącego.

Powinien zapoznać się z listą przeciwwskazań.

Przed zabiegiem plastyki powiek ,pacjent powinien zapoznać się szczegółowo z następującymi punktami:

Pacjent ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi możliwymi powikłaniami jakie mogą pojawić się po wykonanym zabiegu.

Przed zabiegiem, pacjent dostaje informacje jak będzie wyglądał przebieg plastyki powiek i jak powinien postępować w okresie rekonwalescencji

PLASTYKA POWIEK

Plastyka powiek ma na celu usunięcie nadmiaru skóry powiek górnych i dolnych oraz tzw. "worków pod oczami". Dla większości z nas wygląd stanowi ważną zaletę, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Poprzez poczucie atrakcyjności zwiększają się nasze szanse na osiągnięcie sukcesu. Operacja ta przeprowadzana jest jednak nie tylko z przyczyn kosmetycznych mających na celu poprawę wyglądu pacjenta, ale niekiedy jest konieczna dla polepszenia funkcji powiek.

NIEZBEDNE BADANIA PRZED ZABIEGIEM

Przed samym zabiegiem korekcji powiek niezbędna jest wizyta u lekarza specjalisty, który szczegółowo zapozna pacjenta z procedurą i leczeniem.

Dodatkowymi badaniami, które pacjent powinien wykonać przed zabiegiem są badania laboratoryjne: grupa krwi, morfologia z rozmazem, OB, układ krzepnięcia (APTT, INR, PT, wskaźnik Quicka).

W przypadku znieczulenie ogólnego również: elektrolity, glikemia na czczo, HBs, HCV, EKG dla osób po 50 roku życia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma wyraźnych przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu.

Natomiast przeszkodą mogą być:

- duszność,
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- cukrzyca,
- niestabilne ciśnienie,
- nadczynność tarczycy,
- infekcje ropne skóry
- anatomiczna budowa oczu pacjenta

PRZEBIEG ZABIEGU I REKONWALESCENCJA

Rodzaj znieczulenia: miejscowe lub ogólne.

Czas trwania zabiegu: 30-60 min.

Pobyt w klinice: pacjentki opuszczają klinikę 2-3 godziny po zakończeniu zabiegu

Rekonwalescencja: typowe jest wystąpienie obrzęków i okularowych zasinień wokół oczu ustępujących w ciągu 7-14 dni. Możliwe łzawienie lub niewielkiego stopnia pieczenie powiek w ciągu 2-3 dni po zabiegu. Nie występują natomiast dolegliwości bólowe.

powrót do pracy - po 7-10 dniach w zależności od szybkości ustępowania zasinień.

powrót do sportu - jak wyżej.

Kontrole po zabiegu: zdjęcie szwów 3-5 dni po zabiegu. Zalecane są też wizyty kontrolne po 1, 6 i 12 miesiącach - nie są one jednak konieczne.

EFEKTY



CHIRURGIA PLASTYCZNA



WYKONAŁA:

ANNA SZUMILAS gr. 33 D